

XP-002324997

(C) WPI/Derwent

AN - 2002-721537 [78]

AP - RU20010113823 20010521

CPY - NKDO-R

DC - P31

FS - GMP1

IC - A61B17/24

IN - PAVLOV V V

PA - (NKDO-R) NOVOK DOCTORS TRAINING INST

PN - RU2187261 C1 20020820 DW200278 A61B17/24 000pp

PR - RU20010113823 20010521

XIC - A61B-017/24

XP - N2002-568842

AB - RU2187261 NOVELTY - Access to deformation is obtained by separating a cartilage in a sagittal plane from perpendicular plate of ethmoid bone at the rear up to anterior nasal spina bluntly along fractures lines, after repairing osseous fragments a cartilage strip is placed into an osseous framework, where a cartilage was situated before a trauma. The method restores nasal breathing and keeps the support of external nose.

- USE - Medicine, stomatology.

- ADVANTAGE - Higher efficiency of therapy. 2 dwg

- (Dwg.1/1)

IW - METHOD TREAT NASAL SEPTUM DEFORM SPORTS

IKW - METHOD TREAT NASAL SEPTUM DEFORM SPORTS

INW - PAVLOV V V

NC - 001

OPD - 2001-05-21

ORD - 2002-08-20

PAW - (NKDO-R) NOVOK DOCTORS TRAINING INST

TI - Method for treating nasal septal deformation in sportsmen

BEST AVAILABLE COPY

XP-002324998

(C) WPI/Derwent


AN - 1990-341022 [45]  
AP - SU19874330945 19871118  
CPY - EYED-R  
DC - P32  
FS - GMP1  
IC - A61F9/00  
IN - KRASNOV M M; MALAEVA L V; UDINTSOV B E  
PA - (EYED-R) EYE DISEASES RES  
PN - SU1535542 A 19900115 DW199045 000pp  
PR - SU19874330945 19871118  
XIC - A61F-009/00  
XP - N1990-260617  
AB - SU1535542 The secondary glaucoma treatment involves forming a conjunctival flap, layering off the scleral coat in the area of the limbus, trepanation of the deep sheet of the scleral coat and introduction of an implant.  
- The implant consists of two strips of ear auto-cartilage which are positioned in the layers of the scleral coat with their free ends introduced into the front chamber.  
- ADVANTAGE - This secondary glaucoma treatment reduces post-operation complications. Bul.2/15.1.90 (2pp Dwg. No.0/0)  
IW - SECONDARY GLAUCOMA TREAT POSITION IMPLANT COMPOSE TWO STRIP  
EAR AUTO  
CARTILAGE SCLERAL COAT LAYER FREE END FRONT CHAMBER  
IKW - SECONDARY GLAUCOMA TREAT POSITION IMPLANT COMPOSE TWO STRIP  
EAR AUTO  
CARTILAGE SCLERAL COAT LAYER FREE END FRONT CHAMBER  
INW - KRASNOV M M; MALAEVA L V; UDINTSOV B E  
NC - 001  
OPD - 1987-11-18  
ORD - 1990-01-15  
PAW - (EYED-R) EYE DISEASES RES  
TI - Secondary glaucoma treatment - by positioning implant composed of two strips of ear auto-cartilage in scleral coat layers with free ends in front chamber



(51)5 A 61 F 9/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ  
ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ  
ПРИ ГНТ СССР

# ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ



(21) 4330945/28-14  
(22) 18.11.87  
(46) 15.01.90, Бюл. № 2  
(71) Всесоюзный научно-исследовательский институт глазных болезней  
(72) М.М.Краснов, Б.Е.Удинцов и Л.В.Малаева  
(53) 617.7(088.8)  
(56) Авторское свидетельство СССР № 731964, кл. А 61 F 9/00, 1977.

(54) СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ВТОРИЧНОЙ ГЛАУКОМЫ  
(57) Изобретение относится к медицине, в частности к офтальмологии. Цель изобретения - уменьшение послеоперационных осложнений. Способ заключается в том, что после образования конъюнктивального лоскута, расслоения склеры в области лимба, удаления глубоких слоев склеры две полоски аутохряща уха вводят в слон склеры. Свободные концы этих полосок помещают в переднюю камеру.

Изобретение относится к медицине, а именно к глазной хирургии.

Цель изобретения - уменьшение послеоперационных осложнений.

Указанная цель достигается тем, что в способе лечения вторичной глаукомы, предусматривающем образование конъюнктивального лоскута, расслоение склеры в области лимба, трепанацию глубокого листка склеры и введение имплантата, в качестве имплантата используют две полоски аутохряща уха, которые помещают в слон склеры, а свободные концы вводят в переднюю камеру.

Способ осуществляют следующим образом.

Под местной инфильтрационной анестезией раствором новокаина (0,5-1,0%) производят разрез кожи уха на задней поверхности ушной раковины длиной 10 мм. Иссекают осколком лезвия ткань хряща уха на всю его толщину размером 7х4 мм. На рану кожи уха накладывают

шелковый шов (непрерывный). Края раны смазывают раствором бриллиантовым зеленым. Из трансплантата хряща вырезают лезвием две полоски с приблизительными размерами 7,0х0,5 мм и толщиной 0,3-0,4 мм. Такие размеры полосок хряща определены опытным путем с целью их лучшей адаптации в отверстие склеры для последующего формирования путей оттока внутриглазной жидкости.

Далее акинезию век и ретробульбарную анестезию проводят по обычной методике, разрез конъюнктивы - в верхнем или наружном квадранте длиной 10 мм параллельно лимбу и отступая от него на 6 мм, намечают П-образный участок несквозными надрезами размером 3х5 мм (большой размер соответствует перекладине П, свободные концы обращены к лимбу). Склеру расслаивают в пределах очерченного участка. На "дне" расслоенного участка склеры иссекают полоску глубоких слоев склеры размером 1х4 мм. Если выпадает радуж-

(19) **SU** (11) **1535542** **A1**

ка, то проводят базальную иридэктомию. Расслаивают склеру на той же глубине, только в противоположную сторону на 2 мм. Две полоски хряща уха одним концом вводят в полость глаза, а другим концом помещают в слои склеры и накладывают 2 узловых шва на свободные углы склерального лоскута. Переднюю камеру заполняют физиологическим раствором. Разрез конъюнктивы зашивают непрерывным шелковым швом. Под конъюнктиву вводят раствор антибиотика с дексазоном.

В предлагаемом способе две полоски хряща уха формируют канал, по которому оттекает внутриглазная жидкость из полости глаза под конъюнктиву.

Пример. Больной Р. с диагнозом: вторичная некомпенсированная глаукома, бельмо роговицы, сквозной кератопротез, афакия левого глаза.

При поступлении: острота зрения правого глаза 1,0, острота зрения левого глаза = 0,2 п/к.

ОД - злоров.

ОС - спожен. Своды средней глубины. В центре бельма роговицы оптический цилиндр сквозного кератопротеза. Стеклоидное тело - прозрачное. Глазное дно: серая глаукоматозная экскавация диска зрительного нерва. ВГД 36 мм рт.ст. (измерение внутриглазного давления на пневмотонографе).

Операция: склерэктомия с пренированием передней камеры полосками хряща уха и базальной иридэктомией левого глаза

Операцию проводили по следующей схеме. Под местной инфильтрационной анестезией раствором новокаина (0,5-1,0%) производили разрез кожи уха на задней поверхности ушной раковины длиной 10 мм. Иссекли осколком лезвия ткань хряща на всю его толщину размером 7x4 мм. На рану кожи уха накладывали непрерывный шелковый шов. Край раны смазывали раствором бриллиантовым зеленым. Из трансплантата хряща вырезали две полоски размером 7,0x

х0,5 мм и толщиной 0,3-0,4 мм. Далее акинезию век и ретробульбарную анестезию проводили по обычной методике, разрез конъюнктивы осуществляли в верхнем квадранте длиной 10 мм параллельно лимбу и отступая от него на 6 мм, намечали П-образный участок сквозными надрезами размером 3x5 мм (большой размер соответствует перекладине П, свободные концы обращены к лимбу). Склеру расслаивали в пределах очерченного участка. На "дне" расслоенного участка склеры иссекали полоску глубоких слоев склеры размером 4x1 мм. В рану вводила радужная оболочка и была произведена базальная иридэктомия. Склеру расслаивали на той же глубине, только в противоположную сторону на 2 мм. Две полоски хряща уха одним концом помещали в полость глаза, другим концом - в слои склеры и накладывали 2 узловых шва на свободные углы склерального лоскута. Переднюю камеру заполняли физиологическим раствором. На разрез конъюнктивы накладывали непрерывный шелковый шов. Под конъюнктиву вводили дексазон с гентамицином. Осложнений во время операции и в послеоперационном периоде не наблюдалось.

Предлагаемый способ позволяет достичь стойкой компенсации внутриглазного давления у больных с вторичной глаукомой.

#### Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я

Способ лечения вторичной глаукомы путем образования конъюнктивального лоскута, расслоения склеры в области лимба, трепанации глубокого листка склеры и введения имплантата, с целью уменьшения послеоперационных осложнений, в качестве имплантата используя две полоски аутохряща уха, которые помещают в слои склеры, а свободные концы вводят в переднюю камеру.

Составитель Э.Гамм

Редактор А.Лехнина

Техред М.Дидык

Корректор И.Муска

Заказ 67

Тираж 473

Подписное

ВНИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР  
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г.Ужгород, ул. Гагарина, 101